

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(Tél. 92-97-11 - Postes 440 & 449)

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

Régie de Recettes de la D. D. A.

Sous-Régisseur de Recettes du Service de la Protection des Végétaux, Cité Administrative, Rue Pelissier

C.C.P. : CLERMONT-FERRAND 5.503-17

63034 CLERMONT-FERRAND CEDEX

ABONNEMENT ANNUEL

30,00 F

Tél. nouveau n°

92 - 42 - 68

BULLETIN N° 21 du 8 AOÛT 1974.-

## ARBRES FRUITIERS

### CARPOCAPSE. - (Poiriers et Pommiers)

Le second vol du Carpocapse des poires et des pommes est en cours, et des attaques pourront se produire prochainement.

Il est conseillé d'effectuer un traitement dans les premiers jours de la semaine du 12 au 18 Août.

S'il y a lieu, intervenir en même temps contre les Acariens (les populations de *Panonychus ulmi* deviennent importantes dans certains vergers).

## VIGNE

### BLACK-ROT. -

Dans les secteurs où la maladie est implantée, les attaques sont, parfois, graves, dans certains clos (en particulier, clos situés à proximité de vignes en friche, elles-mêmes très largement contaminées).

Il est rappelé, que dans le département de l'Allier, un arrêté préfectoral rend obligatoire l'arrachage ou la remise en culture des vignes abandonnées.

Il est conseillé de poursuivre les traitements dans les vignes atteintes, les dégâts, sur grappes, pouvant continuer jusqu'à la récolte.

## POMMES DE TERRE

### MILDIOU. -

Les traitements ne sont à poursuivre que sur les parcelles plantées tardivement et qui sont encore en pleine végétation (cultures situées en altitude en particulier).

En cas d'attaques de Mildiou ne pas attendre qu'il y ait plus de 10 % du feuillage détruit pour procéder au défanage.

Celui-ci peut être réalisé avec l'un des produits suivants : chlorate de soude, dinosèbe, diquat, D.N.O.C. huileux.

Dans les régions où les dernières pluies ont été importantes, étendre le traitement Mildiou aux Tomates.

## BETTERAVES

### CERCOSPORIOSE. -

En raison de la sécheresse, jusqu'à ce jour, la maladie ne semble pas s'être manifestée.

Si des foyers isolés sont observés, effectuer un traitement dans les cultures intéressées, 2 à 3 jours après la prochaine pluie importante.

Les produits suivants sont efficaces : produits cupriques ou organo-cupriques, bénomyl (seul ou en association avec du manèbe), méthylthio-phanate (seul ou en association avec du manèbe), thiabendazole.

Clermont-Ferrand, le 8 Août 1974.

Le Chef de la Circonscription

Phytosanitaire :

P. DENIZET.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie  
Chargé des Avertissements Agricoles  
A. LECLERC.

Tirage n° 904 du 8 Août 1974.